

Chapitre 4:

Urticaires



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

4.1 Urticaires de contact



Urticaire de contact au latex

Papules urticariennes survenant dans les minutes qui suivent le port de gants chirurgicaux en latex. Ces papules peuvent déborder l'endroit strict du contact car il s'agit d'une urticaire immuno-allergique (avec parfois présence d'IgE spécifiques). Une urticaire généralisée avec manifestations générales peut donc survenir : rhinite allergique, conjonctivite, crises asthmatiformes, choc anaphylactique.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer




dernière page vue



précédente



suivante



Prick test au latex

Mise au point d'une urticaire de contact au latex : le prick test est effectué à l'aide d'une lancette à partir du liquide d'incubation des gants en latex incriminés.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Test de provocation aux gants en latex

Dans les cas douteux (prick test difficilement interprétable) une épreuve de provocation à l'aide du gant incriminé peut éventuellement être effectuée. Celui-ci se fera toujours d'abord à l'aide d'un doigtier enfilé pendant 10 minutes sur des mains préalablement humidifiées. Le test de provocation doit toujours être effectué en milieu hospitalier.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

4.2 Urticaires physiques



Dermographisme

Le frottement de la peau à l'aide d'une pointe mousse permet de mettre en évidence un érythème linéaire à composante oedémateuse. Le dermographisme apparaît 5 à 10 minutes après le frottement. Il peut être isolé ou associé à une urticaire chronique idiopathique.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Facteurs mécaniques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Urticaire à la pression

Oedème profond, très prurigineux survenant plusieurs heures (6 à 12) après une pression forte sur une zone précise par exemple, sur la face palmaire. Les pieds après la marche ou les fesses après une station assise prolongée peuvent également être atteints.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Facteurs mécaniques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Urticaire au froid

Eruption déclenchée par le froid : l'application d'un glaçon pendant 3 à 10 minutes reproduit de façon systématique une papule urticarienne. Néanmoins, dans le cas présent, il conviendrait d'éliminer en un second temps l'urticaire aquagénique (par un test d'immersion d'une main dans de l'eau à température ambiante).

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Froid



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Urticaire solaire

Cette variété très rare d'urticaire survient dans les minutes qui suivent une exposition à la lumière solaire. L'éruption peut durer trois à quatre heures. L'exploration photobiologique confirme très facilement le diagnostic (photo-test en UVA et/ou en UVB positif).

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Soleil, Ultraviolets



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante

4.3 Urticaires communes (médicamenteuses, alimentaires, idiopathiques)



Papules ortiées

Eruption de papules oedémateuses, ortiées pouvant confluer en vastes placards. Le prurit est constant et peut empêcher le sommeil. Cette urticaire peut être la première manifestation d'un choc anaphylactique.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Urticaire papuleuse

Papules urticariennes disséminées sur le corps de manière symétrique. Les médicaments sont les agents responsables les plus souvent incriminés. Les aliments peuvent parfois provoquer ce type d'urticaire (urticaire aiguë). Les fraises, les crustacés, les poissons, certaines céréales, le lait, les oeufs, ainsi que certains additifs alimentaires sont les plus souvent en cause. Le diagnostic est basé essentiellement sur les tests de provocation (suppression et réintroduction du médicament ou de l'aliment incriminés).

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suyvante



Urticaire figurée

Les papules urticariennes dessinent des arabesques ou des formes géographiques. Dans ce cas, l'origine médicamenteuse pourrait être plus fréquemment retrouvée (aspirine, codéine, pénicilline ...). Ici encore, l'épreuve de suppression avec éventuelle réintroduction permet d'obtenir un diagnostic précis.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Agents chimiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Oedème de quincke (urticaire profonde)

Urticaire profonde, peu prurigineuse atteignant essentiellement le visage (paupières et lèvres en particulier) ainsi que la glotte voire le larynx. Il s'agit d'une urgence nécessitant des mesures rapides sur le plan thérapeutique (adrénaline et corticostéroïdes en particulier). Les causes médicamenteuses ne sont pas exceptionnelles.

lésions élémentaires: Papules dermiques

causes: Non spécifiques



recherche

contenu

imprimer



dernière page vue



précédente



suivante



Vasculite urticarienne

Association d'urticaire et de lésions de vascularite leucocytoclasique. Les lésions urticariennes sont beaucoup plus fixes que dans l'urticaire classique. Elles perdurent 2 à 3 jours et s'accompagnent fréquemment d'arthralgies et de fièvre. Une hypocomplémentémie est fréquemment observée.

lésions élémentaires: Macule érythémateuse;
Papules dermiques

causes: Non spécifiques



recherche



contenu



imprimer



dernière page vue



précédente



suivante