

Capítulo 3:

Eccemas



búsqueda



contenido



imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

lesiones básicas

causas

fotografía

alfabético

3.1 Eccemas de contacto alérgicos y dermatitis de irritación



Eccema de contacto agudo exudativo

Eccema de contacto alérgico agudo, exudativo, de las caras de flexión de los antebrazos y de los brazos después de aplicaciones repetidas de una loción antiséptica. Reacción alérgica a la hexamidina. Sobre un fondo de eritema congestivo, estallan innumerables vesiculitas translúcidas, liberando una serosidad transparente.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de contacto crónico de origen profesional

En un albañil, lesiones eritematoescamosas, discretamente queratósicas, agrietadas e infectadas, localizadas en el dorso de los dedos. Reacción alérgica a las sales de cromo presentes en los cementos.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Queratosis; Escamas; Fisuras

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de contacto vesiculoso

Eccema de contacto alérgico agudo, eritemato-pápulo-vesiculoso que afecta al dorso de las manos de un fisioterapeuta. Reacción alérgica a la lanolina presente en una crema para masaje. La mano derecha está más dañada que la izquierda. Eritema difuso, mal delimitado, difuminado en sus bordes, cubierto de pequeñas vesículas translúcidas.



lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de contacto vesiculoso

continuar

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de contacto bulloso

Eccema de contacto alérgico agudo en el dorso del antepié y de los dedos del pie. Reacción alérgica a las sales de cromo, agente curtiente del cuero del calzado. Las bullas se forman sobre un fondo eritematovesiculososo. ▶

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas; Bullas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Ecema de contacto bulloso

continuar

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas; Bullas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema costroso

Eccema de contacto alérgico al níquel de un botón de pantalón tejano. En la zona de contacto se observa una placa costrosa, grisácea y erosionada parcialmente por las excoriaciones de rascado. En el borde, se extiende un eccema eritemato-pápulo-vesiculoso de límites difuminados. ▶

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Pápulas dermoepidérmicas; Vesículas; Costras;
Excoriaciones
causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema costroso

continuar

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Pápulas dermoepidérmicas; Vesículas; Costras; Excoriaciones
causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de contacto seco, eritemato escamoso

Eccema de contacto alérgico de los párpados debido a la utilización de una crema antiarrugas, reacción alérgica al Kathon CGR, agente conservador de la crema. Placas eccematosas, eritematosas, finamente escamosas, mal delimitadas, pruriginosas.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis de irritación aguda

Dermatitis de irritación aguda del dorso de las manos y de los dedos consecutiva a un contacto con detergentes. Eritema difuso, pruriginoso. Los límites del eritema son claros y corresponden a la zona de contacto con los agentes irritantes.

lésiones básicas: Mácula eritematosa

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis de irritación crónica

Dermatitis de irritación crónica del dorso de la mano y de los dedos consecutiva a un contacto con detergentes. Eritema escamoso, queratósico y agrietado, ocasionando prurito y sensaciones dolorosas.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Queratosis; Escamas; Fisuras

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis de irritación crónica palmar

Placas queratósicas gruesas, grisáceas o negruzcas, resquebrajadas por la presencia de fisuras y cortadas por grietas. El cuadro clínico es consecuencia de la conjunción de agresiones físicas (fricciones, microtraumatismos) y químicas.

lésiones básicas: Queratosis; Fisuras

causas: Factores mecánicos; Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.2 Eccema constitucional O dermatitis atópica



Dermatitis atópica facial del lactante

Placas eccematosas de color escarlata, edematosas y vesículoexudativas. Los límites están mal definidos. Las lesiones predominan en las zonas convexas de la cara, como frente, mejillas y barbilla.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis atópica: eccema retroauricular infectado

Lesiones eritematoexudativas pruriginosas del surco retroauricular, localizadas en una fisura en el fondo del pliegue. La presencia de costras amarillentas son la señal de una infección microbiana. Estas lesiones, clásicas en la infancia, pueden persistir en la edad adulta.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Costras; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis atópica de la infancia

Lesiones muy pruriginosas de eccema exudativo de los párpados y boquera atópica.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis atópica de los pliegues en el niño

Placas liquenificadas, muy pruriginosas, localizadas en los huecos poplíteos y salpicadas de estrías de rascado. En el caso presente, existen lesiones similares en otros pliegues (pliegues del codo, retroauriculares, subglúteos). Las lesiones pueden persistir en la edad adulta.

lésiones básicas: Excoriaciones

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema de los pezones

Signo de dermatitis atópica en la edad adulta

Lesiones eczematosas agudas, exudativas del pezón, de la areola y de la región periareolar. Los límites de las lesiones están difuminados. El prurito es intenso y la evolución crónica. Es una señal clásica de atopia en la edad adulta.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Pápulas dermoepidérmicas; Vesículas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Queilitis atópica

La queilitis atópica invade los labios superior e inferior y se extiende por la región peribucal. Son lesiones eccematosas, secas, que generan descamación crónica.

lésiones básicas: Escamas; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis atópica del adulto: xerosis, liquenificaciones y prurigo

Se trata de una lesión polimorfa muy particular, que cursa con una piel de aspecto seco y rugoso (xerosis) y placas liquenificadas. Se intercalan pápulas de tamaño variable, muy infiltradas, de consistencia dura y frecuentemente excoriadas. Son las pápulas del prurigo (que en el pasado recibían el nombre de "prurigo de Besnier").

lésiones básicas: Pápulas dermoepidérmicas;
Excoriaciones

causas: Factores mecánicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Conjuntivitis atópica

Conjuntivitis atópica asociada a blefaritis. Esta inflamación de las conjuntivas es molesta, en ocasiones dolorosa y a menudo comporta una cronicidad desesperante. No es infrecuente en el atópico adulto.

lésiones básicas: Mácula eritematosa

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatitis atópica de las manos del adulto

Eccema crónico eritematoescamoso del dorso de las manos. Un elemento bastante característico es la irregularidad de la distribución de las lesiones ("patchy pattern"). Se afectan algunos dedos mientras que otros permanecen indemnes. El dorso de las manos está afectado de una manera irregular. Esta característica "ilógica" de la topografía de las lesiones se detecta frecuentemente en la atopía.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Pitiriasis simple (eccema seco furfuraceo)

Mácula redondeada de eccema seco, eritematoescamoso, que se localiza en la mejilla de un niño. Evoluciona espontáneamente hacia la curación, con tendencia a la acromia transitoria residual, de donde procede el nombre de pitiriasis simple o alba. Aparece más frecuentemente en el contexto de una atopia.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;
Máculas acrómicas;
Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatosis plantar juvenil

Esta afección, que generalmente se localiza en el tercio anterior de la planta, siempre bilateral y a menudo simétrica, se caracteriza por la triada: eritema, hiperqueratosis y fisuras. La piel adopta frecuentemente un aspecto lustroso y colodionado. ▶

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas;
Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dermatosis plantar juvenil

continuar

Se caracteriza a menudo por agravamientos invernales y es posible que aparezca con más frecuencia en los pacientes atópicos ("atopic winter feet").

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.3 Eccema numular (eccema discoide)



Variedad exudativa

placa eritematosa redonda (nummus = moneda) salpicada de numerosas vesículas exudativas que evolucionan hacia la formación de diminutas costras. ▶

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas; Costras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema numular (eccema discoide)

continuar

Variiedad seca de eccema numular:

presenta numerosas placas eritematosas redondas u ovaladas, bien delimitadas y aisladas, cuyo diámetro fluctúa entre uno y varios centímetros. Están cubiertas de finas escamas secas.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.4 Eccema de estasis



Placas de eccema seco, eritematoescamoso, pruriginoso, que se acompaña a menudo de estrías de rascado. Se localizan en ocasiones a lo largo de trayectos varicosos.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.5 Eccema seborreico



Eccema seborreico del torax

Placas rojas torácicas circinadas, cubiertas de escamas grasas, discretamente pruriginosas. El centro de la lesión experimenta una evolución hacia una acromia muy discreta.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Máculas acrómicas; Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema seborreico del borde del cuero cabelludo

Se caracteriza por la presencia en el cuero cabelludo de un eritema difuso, pruriginoso, recubierto de escamas grasas. En ocasiones, como en el caso presente, las lesiones se extienden sobre la frente o forman lo que se suele denominar la corona seborreica, es decir manchas eritematosas, salpicadas de escamas esteatoides que, siguiendo el borde del cuero cabelludo, dibujan en sus márgenes festones y arquerías.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema seborreico de la cara

Las lesiones eritematoescamosas, bien delimitadas, se localizan en zonas características: borde del cuero cabelludo, pliegues nasogenianos, pliegue vertical medio frontal y borde libre de los párpados inferiores.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.6 Dishidrosis y eccema dishidrótico



Dishidrosis de los dedos

Las vesículas dishidróticas se agrupan en las caras laterales de los dedos, son duras al tacto, asientan en la epidermis, son translúcidas y se suelen comparar a "granos de sagú o de tapioca cocidos". Producen un prurito intenso.

lésiones básicas: Vesículas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Dishidrosis bullosa palmar

Las vesículas asientan en la epidermis palmar fusionándose para formar verdaderas bullas, en ocasiones hemorrágicas.

lésiones básicas: Vesículas; Bullas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Eccema, dishidrótico palmar

El eccema dishidrótico representa una asociación de vesículas de dishidrosis y de placas eritematoescamosas de límites difuminados. El prurito es lancinante y la evolución pasa por brotes sucesivos, incluso subintrantes.

lésiones básicas: Mácula eritematosa; Vesículas;
Escamas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

3.7 Eccema fisurado (o eritema fisurado)



Eccema seco de límites imprecisos, que recuerda un "embaldosado irregular de piedras planas". Las ensambladuras de las baldosas corresponden a fisuras más o menos profundas, muy discretamente sanguinolentas. Actualmente, se prefiere la denominación de eritema fisurado.

lesiones básicas: Mácula eritematosa; Fisuras

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente